



냉해·동해로부터 과수·채소를 보호합니다!

특수 해조 크림 엽면 살포용 비료

# 파라곤

일본산

신엽충실  
경엽면발 및 경엽회복!!!

피해발생 전 그리고,  
서리가 내린 후에 살포

특수 해조 크림에는 서리, 가뭄과 염해에 견디는데 중요한 역할을 하는 베타인이 고농도로 포함되어 있습니다.

(다른 해조 추출물의 5~13배)



- 본 제품은 해조 아스코필럼 노도섬(Ascophyllum nodosum)을 크림 형태로 20% 배합하였으며 비료성분외에 식물의 성장에 필수적인 천연의 각종 아미노산, 알긴산, 다당류, 비타민류, 핵산, 효소, 색소, 식물 호르몬 유사 물질(사이토카이닌) 및 베타인을 풍부하게 함유하고 있습니다.
- 비료성분과 밸런스가 좋은 천연 성분과의 시너지 효과에 의해 훌륭한 생육 증진, 증수 및 품질 향상 효과를 발휘합니다. 또한 각종 미량요소 결핍에도 유효합니다.

| 성 분 | 보증성분(%) |     |     |     |     |     | 배합성분(%) |      |      |      | 특수해조<br>크림(%) |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|------|------|---------------|
|     | 질소      | 인산  | 加里  | 고토  | 망간  | 붕소  | 철       | 동    | 아연   | 몰리브덴 |               |
|     | 7.0     | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 0.1     | 0.05 | 0.05 | 0.1  | 20.0          |

| 사과의사용시기와<br>사용방법(예) | 사용목적             | 사용시기       | 사용횟수  | 사용량          | 사용방법 |
|---------------------|------------------|------------|-------|--------------|------|
|                     | 동해 경감, 서리피해 경감   | 발아직전 ~ 전엽기 | 1~2 회 | 500 ~ 1000배  | 경엽살포 |
|                     | 신엽충실, 결실향상, 생육증진 | 개화시 ~ 낙화기  | 2~3 회 | 1000 ~ 2000배 |      |



株式会社ニッソーグリーン  
Nisso Green Co., Ltd.



동방그린팜은  
동방아гро 자회사입니다.



# 파라곤

**사용방법**      **사용농도 1,000배~2,000배 살포액량 일반농약과 동일**

| DN170<br>(작물의 생육기) | 대상작물명                 | 비 효                                                        | 살포시기 및 사용방법                                 |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                    | 사과·감·배·비파·키위          | 신엽충실, 결실향상<br>과의 신장증진, 당도· 착색<br>증진, 저장성향상, 수세회복,<br>해거리에방 | 개화직전, 낙화직후 및 유과기의 3회살포                      |
|                    | 체리                    |                                                            | 개화직전, 낙화직후의 2회살포                            |
|                    | 복숭아·자두·매실·포도          |                                                            | 신엽전개 초기부터 10일간격으로 3회살포                      |
|                    | 감귤·만감류                |                                                            | 개화직전, 낙화직후 2회살포                             |
|                    | 토마토·오이·고추·가지·피망 등 과채류 | 생육증진, 착과수증가, 착색증진,<br>수확최성기 수량감소의 예방, 증수                   | 정식1주후부터 1~2주간격으로 정기적으로 살포                   |
|                    | 메론·수박·호박·참외·박과류 등 과채류 | 생육증진, 꽃수분향상,<br>과의 신장증진                                    | 정식1주후부터 1~2주간격으로 개화기까지 2~3회살포               |
|                    | 딸기                    | 활착·생육촉진, 꽃수분향상,<br>착색촉진, 품질향상                              | 모종침지 및 정식 1~2주후부터 2주간격으로 4회살포               |
|                    | 시금치·상추·배추·샐러리·파·양배추   | 생육증진, 잎품질향상, 증수                                            | 본엽 3~5매 또는 정식 1~2주후부터 2주간격으로 3회살포           |
|                    | 인삼·당근·무·순무·우엉         | 생육증진, 근부비대, 품질향상                                           | 본엽 5~6매 부터 2주간격으로 3회살포                      |
|                    | 양파·마늘·생강·쪽파·구근류       | 활착증진, 경엽생육증진,<br>비대증진, 증수                                  | 묘 침지 및 정식 1~2주부터 2주간격으로 3회살포                |
|                    | 팔·완두콩·강낭콩·콩·땅콩        | 착협율 증진, 자실증진, 증수                                           | 4~6엽기 및 개화전 2회살포                            |
|                    | 감자·고구마                | 생육증진, 근부 비대증진                                              | 초장10~20cm부터 2주간격으로 3회살포                     |
|                    | 참마                    |                                                            | 수확 2개월전부터 10일간격으로 2~3회살포                    |
|                    | 차                     | 신초신장증진, 엽질향상,<br>엽록소증가, 증수, 수세회복                           | 맹아직전, 맹아시 및 2엽기에 3회살포<br>2번차 이후에도 동일하게 3회살포 |
|                    | 벼                     | 묘충실, 활착증진, 임실율 향상                                          | 육묘기에 2~3회 관주, 유수형성기에 1~2회살포                 |
|                    | 옥수수                   | 임실율 향상                                                     | 7~8엽기에 1~2회살포                               |
|                    | 야채모종·화훼모종             | 묘충실, 활착증진                                                  | 묘상에 1~2회살포 또는 이식 모종 침지                      |

**비중은 1.25입니다. 물100ℓ 에 본제품 약80ml를 희석하면 1,000배액이 됩니다.**

## 주의사항

- 석회유황합제와 혼용하면 유독가스가 발생할 우려가 있으므로 혼용하지 마십시오.
- 기계유와는 혼용하지 마세요.
- 작물보호제와 혼용하는 경우는 물에 ① 전착제 → ② 파라곤 → ③ 작물보호제 순서로 혼용해 주세요.
- 극단적인 저온시에는 효과가 떨어질수 있습니다.



**동방그린팜**

서울특별시 관악구 남부순환로 2028

TEL.02-580-3795

동방그린팜은 동방아그로의 자회사입니다.